

CME Credit

การอ่านบทความพื้นฟูวิชาการในเวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับ ปีที่ 57 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2547 คิดเป็น CME เครดิต 2 ชั่วโมง ท่านผู้อ่านสามารถส่งคำตอบของคำถามต่อไปนี้ มารับเครดิตได้

- โรคใดจัดอยู่ในกลุ่มหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบ (small vessel vasculitis)
 - Churg-Strauss syndrome
 - Henoch-Schonlein purpura
 - Microscopic polyangiitis
 - Wegener's granulomatosis
 - ถูกหมดทุกข้อ
- การตรวจ ANCA (anti-neutrophilic cytoplasmic antibody) โดยวิธี indirect immunofluorescence assay ใช้เซลล์ชนิดใดเป็น substrate
 - Human granulocytes
 - Human epithelioma cells
 - Monkey esophagus cells
 - Mouse kidney cells
 - Rat liver cells
- การตรวจ ANCA โดยวิธี indirect immunofluorescence assay ที่ให้ผลบวกโดยการติดสีเรืองแสงทั่วไปใน cytoplasm เกิดจากการจับกันของ ANCA กับสารใด
 - Azurocidin
 - Cathepsin G
 - Elastase
 - Lactoferrin
 - Proteinase 3
- กลุ่มโรคใดที่อาจตรวจพบ ANCA ได้
 - Connective tissue disease
 - Drug-induced vasculitis
 - Infectious disease
 - Pulmonary-renal syndrome
 - ถูกหมดทุกข้อ
- ผู้ป่วยในข้อใดควรได้รับการตรวจหา ANCA
 - Chronic destructive disease of the upper airways
 - Long-standing sinusitis
 - Pulmonary-renal syndrome
 - Rapidly progressive glomerulonephritis
 - ถูกหมดทุกข้อ
- อาการแสดงทางคลินิกในระบบใดที่พบเป็นอาการนำของโรค Wegener's granulomatosis บ่อยที่สุด
 - Central nervous system
 - Gastrointestinal tract
 - Genitourinary tract
 - Upper respiratory tract
 - Lower respiratory tract
- ผู้ป่วยโรค Wegener's granulomatosis ที่มีอาการของ chronic sinusitis มักพบร่วมกับการติดเชื้อใดมากที่สุด
 - Aspergillus fumigatus
 - Hemophilus influenzae
 - Mycobacterium tuberculosis
 - Staphylococcus aureus
 - Streptococcus pneumoniae
- ความผิดปกติของภาพรังสีปอดใดที่พบในผู้ป่วย Wegener's granulomatosis บ่อยที่สุด
 - Diffuse alveolar hemorrhage
 - Hilar node enlargement
 - Localized pulmonary infiltration
 - Pleural effusion
 - Pulmonary nodules

9. ผู้ป่วย Wegener's granulomatosis ที่มีการทำงานของไตผิดปกติควรได้รับการรักษาด้วยยาใด
- A. Azathioprine
 - B. Cyclophosphamide
 - C. Methotrexate
 - D. Corticosteroid ร่วมกับ cyclophosphamide
 - E. Corticosteroid ร่วมกับ methotrexate
10. ผู้ป่วย Wegener's granulomatosis ที่ได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันควรได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อใด
- A. Candida albican
 - B. Cryptococcus neoformans
 - C. Nocardia asteroides
 - D. Mycobacterium tuberculosis
 - E. Pneumocystis carinii

ชื่อ ผู้ตอบ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ที่อยู่

.....

.....

.....

คำตอบ ให้กากระบาท (X) คำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อ (one best answer)

- | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| ข้อ 1. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 2. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 3. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 4. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 5. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 6. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 7. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 8. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 9. | A | B | C | D | E |
| ข้อ 10. | A | B | C | D | E |

กรุณาส่งคำตอบมาที่

พ.อ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์

แผนกโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400

หรือโทรสาร 0-2644-6997

