

เฉลยคำตอบฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 47

Systemic anaplastic CD30⁺ large-cell lymphoma

พบ extranodal disease ได้ถึง 40% โดย skin เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุด ลักษณะของ skin จะแยกจาก primary cutaneous form ลักษณะของ skin จะพบเป็น erythematous papules ใน systemic type อาจพบมี internal organ involvement ได้เช่นที่ปอด (pleural effusion) และไขกระดูก ผู้ป่วยอาจมีไข้ น้ำหนักลด หรือเหงื่อออกตอนกลางคืน การตรวจ immunophenotype จะพบ tumor cells ติด CD30 และ T cell antigens การรักษาโดยให้ systemic chemotherapy (doxorubicin-based)¹

เอกสารอ้างอิง

1. Kadin ME, Liu HL, Kim YH, Hoppe RT. CD30⁺ Cutaneous lymphoproliferative disease (Anaplastic large-cell lymphoma) and lymphomatoid papulosis in Non-Hodgkin's lymphomas. Mauch PM, Armitage JO, coiffier B, Dalla-Favera R and Harris NL (eds). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003, p 333-343.