

CME Credit

การอ่านบทความพื้นฟูวิชาการในเวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับปีที่ 58 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2548 คิดเป็น CME เครดิต... ชั่วโมง ท่านผู้อ่านสามารถส่งคำตอบของคำถามต่อไปนี้ มารับเครดิตได้

- ข้อใดคือคุณสมบัติของยา NSAIDs ดั้งเดิม
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-1 เท่านั้น
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-2 เท่านั้น
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-1 มากกว่า cyclooxygenase-2
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-2 มากกว่า cyclooxygenase-1
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-1 เท่ากับ cyclooxygenase-2
- ข้อใดคือคุณสมบัติของยา NSAIDs ในรูป COX-2 inhibitors
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-1 เท่านั้น
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-2 เท่านั้น
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-1 มากกว่า cyclooxygenase-2
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-2 มากกว่า cyclooxygenase-1
 - กดการทำงานของ cyclooxygenase-1 เท่ากับ cyclooxygenase-2
- ยาในข้อใดคือยา NSAIDs ดั้งเดิม
 - Aspirin
 - Diclofenac
 - Celecoxib
 - Rofecoxib
 - Vadecoxib
- ยาในข้อใดคือยา NSAIDs ในรูป COX-2 inhibitors
 - Aspirin
 - Diclofenac
 - Naproxen
 - Ibuprofen
 - Rofecoxib
- ข้อใดคือข้อดีของยา NSAIDs ดั้งเดิม
 - ไม่กดการทำงานของไต
 - ผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารเกิดขึ้นได้น้อย
 - ไม่ทำให้เกิดจ้ำเลือดและเลือดออกง่าย
 - ไม่ทำให้เกิดอาการบวมหน้า
 - ทำให้เกร็ดเลือดไม่จับตัวกันเป็นลิ่มเลือดได้ง่าย
- ข้อใดคือข้อดีของยา NSAIDs ในรูป COX-2 inhibitors
 - ไม่กดการทำงานของไต
 - ผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารเกิดขึ้นได้น้อย
 - ไม่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น
 - ไม่ทำให้เกิดอาการบวมหน้า
 - ทำให้เกร็ดเลือดไม่จับตัวกันเป็นลิ่มเลือดได้ง่าย
- ข้อใดเป็นผลเสียของ NSAIDs ดั้งเดิมที่พบบ่อยที่สุด
 - ปวดแสบท้องและเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
 - ความดันโลหิตสูง
 - เกิดจ้ำเลือดที่ผิวหนัง
 - บวมหน้า
 - ตับอักเสบ
- ข้อใดคือภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังให้มากที่สุดจากการใช้ยา NSAIDs ในรูป COX-2 inhibitors
 - ปวดแสบท้อง
 - เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
 - เกิดจ้ำเลือดที่ผิวหนัง
 - เลือดหยุดยาก
 - ภาวะหลอดเลือดอุดตัน
- ยาในข้อใดที่ถอนตัวจากท้องตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากเกิดผลข้างเคียงในระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างรุนแรง
 - Celecoxib
 - Rofecoxib
 - Vadecoxib
 - Etoricoxib
 - Lumiracoxib
- ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบซึ่งมีอาการในข้อใดซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม COX-2 inhibitors
 - มีแผลในกระเพาะอาหาร
 - มีแผลในลำไส้
 - มีเกร็ดเลือดต่ำ
 - มีเลือดออกได้ง่าย
 - มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นครั้งคราว

ชื่อผู้เขียน

ชื่อ ผู้ตอบ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ที่อยู่

คำตอบ ให้กากระบาท (X) คำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อ (one best answer)

- ข้อ 1. A B C D E
- ข้อ 2. A B C D E
- ข้อ 3. A B C D E
- ข้อ 4. A B C D E
- ข้อ 5. A B C D E
- ข้อ 6. A B C D E
- ข้อ 7. A B C D E
- ข้อ 8. A B C D E
- ข้อ 9. A B C D E
- ข้อ 10. A B C D E

กรุณาส่งคำตอบมาที่

พ.อ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์

แผนกโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400

หรือโทรสาร 0-2644-6997